

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẰNG MẠC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v hướng dẫn thực hiện một số biện pháp an toàn sinh học để chủ động phòng ngừa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong chăn nuôi nông hộ.

Bằng Mạc, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Các phòng: Kinh tế xã; Văn hóa - Xã hội xã;
- Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 3538/SNNMT-CNTSTY ngày 28/8/2025 của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp an toàn sinh học (ATSH) để chủ động phòng ngừa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trong chăn nuôi nông hộ. UBND xã Bằng Mạc yêu cầu các phòng, ban, các trưởng thôn thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện, báo cáo và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.
- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi quy định tại Điều 4, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
- Tăng cường tuyên truyền người chăn nuôi chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi.
- Tham mưu UBND xã bố trí nguồn lực tại địa phương để triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2025 đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình dịch bệnh tại cơ sở, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo quy định.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, từ đó người dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng,...

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã

Huy động các tổ chức đoàn thể địa phương, tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc

tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, từ đó người dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng,... Vận động Nhân dân đồng thuận và tham gia hưởng ứng tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm.

4. Các Trưởng thôn

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi quy định tại Điều 4, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Tăng cường tuyên truyền người chăn nuôi chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi.

- Tăng cường công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục ở trâu bò, Tai xanh và bệnh Đại.

- Hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để tiến hành điều tra và xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Không giết mổ, không mua bán động vật ốm, chết; không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra môi trường.

- Phối hợp với phòng kinh tế xã tổ chức triển khai tiêm phòng đồng loạt vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn thôn theo kế hoạch của UBND xã.

(Gửi Kèm Văn bản Phụ lục hướng dẫn cụ thể một số biện pháp an toàn sinh học cơ bản nhưng rất quan trọng trong chăn nuôi nông hộ)

UBND xã Bằng Mạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã
- VP HĐND và UBND xã;
- Trong thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT (TVQ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Trung

Phụ lục

**HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH
HỌC PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRONG
CHĂN NUÔI NÔNG HỘ**

(Kèm theo Công văn số 330 /UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2025)

"Hãy phòng bệnh cho đàn lợn bằng các biện pháp an toàn sinh học để chủ động ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập và tiêu diệt mầm bệnh!"

**AN TOÀN SINH HỌC > PHÒNG BỆNH CHỦ ĐỘNG = CÁCH LY +
VỆ SINH + KHỬ TRÙNG**

4 CÓ	5 KHÔNG	6 NHỚ
1. Có hàng rào/ lưới che an toàn 2. Có dụng cụ riêng cho khu nuôi 3. Có bảo hộ lao động an toàn 4. Có hố khử trùng tại cổng/ cửa khu nuôi	1. Không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa được nấu chín kỹ 2. Không cho người lạ, phương tiện vào khu vực chăn nuôi 3. Không nuôi chung lợn với động vật khác 4. Không bán chạy, giết mổ lợn bệnh/chết 5. Không vứt xác lợn, xả nước thải/chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường	1. Nhớ theo dõi sức khỏe đàn lợn hàng ngày 2. Nhớ sử dụng nước sạch, thức ăn bảo đảm 3. Nhớ bổ sung dinh dưỡng, vitamin 4. Nhớ vệ sinh khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ, phương tiện 5. Nhớ khai báo khi có lợn bệnh/chết 6. Nhớ tiêu hủy lợn bệnh/chết theo đúng hướng dẫn.

Hãy báo ngay cho nhân viên thú y hoặc chính quyền địa phương theo số điện thoại/ địa chỉ:

1. NHỮNG VIỆC BÀ CON CẦN LƯU Ý

- Thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm lợn ốm/ bệnh, chết bất thường; lợn có thể có một số biểu hiện bà con dễ quan sát thấy: Sốt cao (40–42°C), lợn ủ rũ, bỏ ăn và có thể chết rất nhanh, thậm chí trước đó không kịp xuất hiện dấu hiệu rõ rệt của bệnh. Nhiều con có vùng da đỏ hoặc tím ở tai, bụng, chân, đặc biệt dễ nhận thấy trên lợn da trắng. Trước khi chết 1–2 ngày, lợn thường thở gấp, khó thở, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy (có thể lẫn máu), mất thăng bằng hoặc co giật...).

- Cách ly ngay (nhốt riêng) lợn nghi bệnh khỏi đàn và báo ngay cho nhân viên thú y hoặc chính quyền địa phương.

△ LƯU Ý ĐẶC BIỆT:

✗ Việc vận chuyển, chôn/tiêu hủy lợn, xử lý chất thải chăn nuôi phải bảo đảm kỹ thuật (đào hố sâu, rắc vôi, phủ đất, nén chặt, đắp đất thành mố cao và có rãnh thoát nước xung quanh,...) theo hướng dẫn của nhân viên thú y hoặc chính quyền địa phương.

✗ Tuyệt đối không vứt xác lợn ra môi trường, đặc biệt là sông, suối, mương, ao, hồ, nơi công cộng.

✗ Mọi biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn lợn ... bà con tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC CƠ BẢN

a) Đối với chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi

- Cải tạo chuồng nuôi, bảo đảm thoáng mát, nền cao ráo, thoát nước tốt.
- Có hố/chậu chứa thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột trước cửa chuồng, lối vào khu vực chăn nuôi, trước cổng nhà.
- Có rãnh thoát nước (để bỏ vôi vào nước) xung quanh khu vực chuồng nuôi.
- Có tường, lưới hoặc bạt che xung quanh, bảo đảm che kín để ngăn chim, chuột, các loài gặm nhấm khác, côn trùng, động vật nuôi khác không xâm nhập vào trong chuồng nuôi.
- Tách biệt chuồng nuôi lợn với khu sinh hoạt của gia đình, với chuồng nuôi động vật khác và khu vực công cộng.
- Có ủng/dép, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ vệ sinh chuồng nuôi sử dụng riêng trong khu vực chăn nuôi (không mang giày dép, dụng cụ ở bên ngoài vào); sử dụng riêng dụng cụ chăn nuôi cho mỗi khu chuồng và phải được vệ sinh, khử trùng trước và sau khi sử dụng; dụng cụ chứa đựng thức ăn thừa, thức ăn thu gom từ nhà hàng/bếp ăn phải được vệ sinh khử trùng trước và sau khi sử dụng.
- Không sử dụng kim tiêm, xi lanh chung cho các chuồng nuôi.
- Phát quang bụi rậm, dọn dẹp sạch khu vực xung quanh chuồng nuôi.

b) Kiểm soát người và phương tiện

- Có biện pháp kiểm soát, hạn chế tiếp xúc với lợn, không cho người ngoài, thương lái, xe vận chuyển lợn hoặc thức ăn chăn nuôi vào khu vực chuồng nuôi.
- Nếu bắt buộc phải vào khu vực chuồng nuôi:
 - + Người: Thay quần áo hoặc mặc quần áo bảo hộ, vệ sinh khử trùng tay, thay ủng/dép sử dụng riêng trong khu vực chuồng nuôi;
 - + Phương tiện: Khử trùng toàn bộ phương tiện, đặc biệt là bánh xe, gầm xe bằng dung dịch sát trùng.

c) Kiểm soát thức ăn và nước uống

- Không dùng thức ăn thừa, thức ăn thu gom từ nhà hàng/bếp ăn, đặc biệt thức ăn thừa có chứa thịt lợn, sản phẩm từ lợn. Nếu bắt buộc dùng, phải đun sôi, nấu chín kỹ trước khi mang vào khu vực nuôi và sử dụng vật dụng chứa đựng riêng biệt để chuyển thức ăn vào cho lợn.

- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn, không bị mốc, đóng vón (không dùng thức ăn thừa từ các trang trại/hộ nuôi đã bị bệnh

DTLCP); nên để bao thức ăn ở ngoài khu vực chuồng nuôi và sử dụng vật dụng chứa đựng (xô, chậu,..) để chuyển thức ăn vào cho lợn.

- Không sử dụng thức ăn thô xanh (rau, bèo,...) được lấy ở những khu vực đang có dịch bệnh DTLCP; nếu bắt buộc dùng, phải đun sôi, nấu chín.

- Nguồn nước sạch cho lợn uống hoặc vệ sinh chuồng: Ưu tiên nước sạch đã qua xử lý (nước giếng, nước máy); tuyệt đối không dùng nguồn nước có nguy cơ đã bị ô nhiễm (nước ao, hồ, sông, suối,..); vệ sinh máng ăn/ máng uống và thay nước uống hàng ngày.

d) Vệ sinh, sát trùng, quản lý chất thải chăn nuôi

- Dọn phân, chất thải hằng ngày, ủ kỹ hoặc che đậy kín, rắc/ trộn vôi bột; tuyệt đối không xả nước thải, chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường.

- Khử trùng chuồng nuôi từ 2–3 lần/tuần bằng thuốc sát trùng có bán trên thị trường (Virkon-S, Iodine, Chlorine,...) theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Giữ chuồng thoáng, nền chuồng luôn khô ráo, giảm ẩm ướt để hạn chế côn trùng.

- Vệ sinh, khử trùng chuồng trại sạch sẽ sau mỗi lứa nuôi, rắc vôi và để trống chuồng 2-3 tuần.

e) Kiểm soát côn trùng, động vật trung gian

- Lắp lưới chắn ruồi, muỗi; đặt bẫy diệt chuột, côn trùng khác.

- Không để thức ăn, phân thải hở ngoài trời để tránh thu hút côn trùng.

- Không để các loại vật nuôi khác (trâu, bò, dê, cừu, chó..) vào khu vực nuôi lợn.

g) Quản lý đàn lợn

- Nguyên tắc nuôi “cùng nhập – cùng xuất”, không nhập thêm lợn trong thời gian nuôi.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và bổ sung dinh dưỡng, vitamin cho lợn.

- Theo dõi sức khỏe đàn lợn hằng ngày: nếu có biểu hiện sốt, bỏ ăn, tím tai, chết đột ngột,... phải báo ngay cho nhân viên thú y hoặc chính quyền xã.

- Không giết mổ, bán chạy lợn bệnh, lợn chết vì làm dịch bệnh lây lan

nhanh.

3. TÁI ĐÀN AN TOÀN

- Chỉ mua lợn giống có nguồn gốc rõ ràng (từ cơ sở uy tín, cơ sở an toàn dịch bệnh) hoặc có giấy kiểm dịch thú y.

- Nuôi nhốt riêng đàn mới ít nhất 21 ngày và sử dụng dụng cụ chăn nuôi riêng cho đàn mới.

- Kê khai số lượng lợn nuôi với chính quyền địa phương khi tái đàn.

**Bà con có thể tham khảo thêm Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi tại Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-CNTY- KHCMNT ngày 18/3/2025 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y./.*